1. Berechne die uneigentlichen Integrale, sofern sie existieren.

(a)
$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^4} \, \mathrm{d}x$$

(e)
$$\int_0^2 \frac{2}{x^2} dx$$

(b)
$$\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^{1.1}} dx$$

(f)
$$\int_0^4 \frac{2}{\sqrt{t}} dt$$

(c)
$$\int_{3}^{\infty} \frac{4+t}{t^3} dt$$

(g)
$$\int_0^4 u^{-\frac{3}{2}} du$$

(d)
$$\int_{-\infty}^{0} e^{-t} dt$$

(h)
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{z^2 + 1} dz$$

2. Zeige mit Abschätzungen durch Integrale, dass der Grenzwert für $n \to \infty$ existiert bzw. nicht existiert.

(a)
$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

existiert nicht

(b)
$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

existiert

3. Welchen Inhalt hat die Fläche, die alle Punkte enthält, deren Koordinaten die Bedingungen

$$0 \le y \le \frac{1}{(x-2)^2} \quad \text{und} \quad x \ge 3$$

erfüllen?

4. Der Graph der Funktion f rotiert für $x \ge 1$ um die x-Achse. Dabei entsteht ein Körper, der sich ins Unendliche erstreckt. Wie gross ist sein Volumen?

(a)
$$f(x) = \frac{1}{x^3}$$

(b)
$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2}$$

1. (a)
$$\int_1^a \frac{1}{x^4} dx = \left[-\frac{1}{3x^3} \right]_1^a = -\frac{1}{3a^3} + \frac{1}{3}$$

$$\lim_{a \to \infty} \left(-\frac{1}{3a^3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

(b)
$$\int_{1}^{a} \frac{1}{x^{1.1}} dx = \left[-\frac{10}{x^{0.1}} \right]_{1}^{a} = -\frac{10}{a^{0.1}} + \frac{10}{10.1} = 10 - \frac{10}{a^{0.1}}$$

$$\lim_{a \to \infty} \left(10 - \frac{10}{a^{0.1}} \right) = 10$$

(c)
$$\int_{3}^{a} \frac{4}{t^{3}} + \frac{1}{t^{2}} dt = \left[\frac{-2}{t^{2}} - \frac{1}{t} \right]_{3}^{a} = -\frac{2}{a^{2}} - \frac{1}{a} - \left(-\frac{2}{9} - \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{9} - \frac{2}{a^{2}} - \frac{1}{a}$$

$$\lim_{a\to\infty}\left(\frac{5}{9}-\frac{2}{a^2}-\frac{1}{a}\right)=\frac{5}{9}$$

(d)
$$\int_{a}^{0} e^{-t} dt = \left[-e^{-t} \right]_{a}^{0} = -1 + e^{-a}$$

$$\lim_{a \to -\infty} \left(-1 + e^{-a} \right) \text{ existient nicht}$$

(e)
$$\int_{a}^{2} \frac{2}{x^{2}} dx = \left[\frac{-2}{x} \right]_{a}^{2} = -1 + \frac{2}{a}$$

$$\lim_{a\to 0} \left(\frac{2}{a}-1\right)$$
 existiert nicht

(f)
$$\int_{1}^{4} \frac{2}{\sqrt{t}} dt = \left[4\sqrt{t}\right]_{a}^{4} = 8 - 4\sqrt{t}$$

$$\lim_{a \to 0} \left(8 - 4\sqrt{t} \right) = 8$$

(g)
$$\int_{a}^{4} u^{-\frac{3}{2}} du = \left[-2u^{-\frac{1}{2}} \right]_{a}^{4} = -1 + \frac{2}{\sqrt{a}}$$


$$\lim_{a\to 0} \left(-1 + \frac{2}{\sqrt{a}}\right)$$
 existiert nicht

(h)
$$2 \int_a^b \frac{1}{z^2 + 1} dz = 2 \left[\arctan z \right]_a^b = 2 \left(\arctan b - \arctan a \right)$$

$$\lim_{a \to -\infty} \left(\lim_{b \to \infty} 2(\arctan b - \arctan a) \right) = \lim_{a \to -\infty} 2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan a \right)$$
$$= 2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 2\pi$$

2. (a)
$$f(1) = 1$$
, $f(2) = \frac{1}{2}$, $f(3) = \frac{1}{3}$, ..., $f(x) = \frac{1}{x}$

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:




$$\int_1^n \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Das Integral ist eine *Minorante* der Summe. Wenn das Integral keinen Grenzwert hat, so kann auch die Summe keinen endlichen Grenzwert haben.

$$\lim_{n \to \infty} \int_1^n \frac{1}{x} dx = \lim_{n \to \infty} [\ln x]_1^n = \lim_{n \to \infty} \ln n \quad \text{existiert nicht}$$

(b)
$$f(1) = \frac{1}{2}$$
, $f(2) = \frac{1}{6}$, $f(3) = \frac{1}{12}$, ..., $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$

Für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ gilt:



$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k+1)} < \int_{1}^{n} \frac{1}{x(x+1)} \, \mathrm{d}x$$

Mit der gleichen Begründung wie im letzten Beispiel, wurde der erste Summand der Summe weggelassen.

Besitzt das Integral einen Grenzwert, so hat auch die Summe einen Grenzwert:

$$\lim_{n \to \infty} \int_{1}^{n} \frac{1}{x(x+1)} \, \mathrm{d}x = \lim_{n \to \infty} \left[\int_{1}^{n} \frac{1}{x^{2} + x} \, \mathrm{d}x \right] < \lim_{n \to \infty} \left[\int_{1}^{n} \frac{1}{x^{2}} \, \mathrm{d}x \right] = \dots = 1$$

Wobei wir ausgenützt haben, dass für jedes x>1 der Funktionswert $\frac{1}{x^2}$ grösser ist, als der von $\frac{1}{x^2+x}$, was zu einer entsprechenden Abschätzung der Integrale führt.

3. Die Bedingung führt auf das uneigentliche Integral:

$$\lim_{a \to \infty} \int_3^a \frac{1}{(x-2)^2} \, \mathrm{d}x = \lim_{a \to \infty} \left[\frac{-1}{x-2} \right]_3^a = \lim_{a \to \infty} \left(1 - \frac{1}{a-2} \right) = 1$$

4. Formel für die Volumenberechnung von Rotationskörpern: $V = \pi \int_a^b \left[f(x) \right]^2 dx$

(a)
$$\lim_{a \to \infty} \pi \int_{1}^{a} \left(\frac{1}{x^{3}}\right)^{2} dx = \pi \lim_{a \to \infty} \int_{1}^{a} \frac{1}{x^{6}} dx = \dots = \pi \lim_{a \to \infty} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5a^{5}}\right) = \frac{\pi}{5}$$

(b)
$$\lim_{a \to \infty} \pi \int_{1}^{a} \left(\frac{\sqrt{x}}{x^{2}}\right)^{2} dx = \pi \lim_{a \to \infty} \int_{1}^{a} \frac{1}{x^{3}} dx = \dots = \pi \lim_{a \to \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2a^{2}}\right) = \frac{\pi}{2}$$